

## UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda će željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.

Drugome ovaj lijek može da škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.

Ako primjetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceutu.

**CORRIGO****5 mg tabletta**  
*nebivolol***Sadržaj uputstva:**

1. Šta je **CORRIGO** i za šta se koristi
2. Prije nego počnete uzimati **CORRIGO**
3. Kako uzimati **CORRIGO**
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati **CORRIGO**
6. Dodatne informacije

**1. Šta je CORRIGO i za šta se koristi**

**CORRIGO** tablette sadrže nebivolol, kardiovaskularni lijek koji pripada grupi selektivnih blokatora beta adrenergičkih receptora (lijekova koji selektivno djeluju na kardiovaskularni sistem).

**CORRIGO** tablette se koriste za tretman:

- esencijalne hipertenzije (povišenog krvnog pritiska) ili
- blagog do umjereno hroničnog zatajenja srca kao dodatak standardnom liječenju kod bolesnika u dobi od 70 godina ili starijih.

**2. Prije nego počnete uzimati CORRIGO****Nemojte uzimati CORRIGO**

- ako ste alergični na aktivnu supstanцу nebivolol ili bilo koji od sastojaka **CORRIGO** tabletta (Vidi dio Dodatne informacije)
- ako imate nizak krvni pritisak
- ukoliko imate simptome poremećaja periferne cirkulacije (bol i hladnoća šaka i stopala, bijedo-modra boja kože)
- ukoliko imate tešku bradikardiju (broj otkucaja srca u minuti manji od 60)
- ukoliko imate druge ozbiljne poremećaje srčanog ritma (atrioventrikularni blok drugog i trećeg stepena, poremećaje provođenja)
- ukoliko imate akutne znake popuštanja srčane funkcije ili kardiogeni šok (hladna i bijleda koža, pad krvnog pritiska, lutanje srca, ubrzano disanje, smanjeno stvaranje urina - simptomi se razvijaju u toku nekoliko sati) jer takav oblik srčanog zatajenja zahtijeva intravensku terapiju za poboljšanje rada srca
- ako imate astmu (otežano disanje praćeno zvižducima u plućima uz produžen izdisaj nakon izloženosti određenom alergenu) ili grč disajnih puteva
- ako imate neliječeći feohromocitom (tumor nadbubrežne žlijezde)
- ako imate ozbiljniji poremećaj jetrene funkcije
- ako imate znake metaboličke acidose (produbljeno disanje koje može dovesti do gubitka svijesti a nastaje usled popuštanja funkcije bubrega, neliječeće šećerne bolesti ili trovanja nekim lijekovima)

**Budite oprezni sa CORRIGO-m**

Obavijestite Vašeg ljekara o svim zdravstvenim problemima koje imate ili ste imali, kao i o svim alergijama.

Obavijestite Vašeg ljekara ako imate:

- usporen rad srca ili poremećaj periferne cirkulacije, npr. Raynaudova bolest ili sindrom, bolovi nalik grčevima dok hodate
- stabilnu (bol ili nelagoda u prsimu koji se javlja kao posljedica fizičke aktivnosti, promjene temperature prostorije/okoliša, psihičkog uzbudjenja ili uzimanja hrane) ili nestabilnu Prinzmetalovu anginu pektoris (bol ili nelagoda u prsimu se javlja učestalo i ne samo kao posljedica fizičke aktivnosti, promjene temperature prostorije/okoliša, psihičkog uzbudjenja ili uzimanja hrane, kao što je slučaj kod stabilne angine pektoris)
- neliječeeno hronično zatajenje srca
- blaži stepen poremećaja srčanog provođenja (srčani blok prvog stepena)
- otežano disanje praćeno zviždanjem u grudima
- šećernu bolest jer upotreba nebivolola može prikriti simptome sniženog nivoa šećera u krvi (lutanje srca, osjećaj gladi, drhtanje, vrtoglavica)
- pretjerano aktivnu štitnu žlijezdu: ovaj lijek može prikriti znakove nenormalnog ubranog pulsa uzrokovanoj tim stanjem
- alergiju: ovaj lijek može pojačati reakciju na polen ili na druge supstance na koje ste alergični
- psoriju (hronično kožno oboljenje koje se manifestuje crvenim mrljama prekrivenim bijelim ljkuscicama)

• u skorije vrijeme zakazan operativni zahvat koji iziskuje uvođenje u anesteziju, prije anestezije uvijek obavijestite anesteziologa da uzimate **CORRIGO** tablette.

Ako imate ozbiljne probleme sa bubrežima, nemojte uzimati **CORRIGO** za liječenje zatajenja srca i obavijestite ljekara. Iskusan ljekar će Vas na početku terapije hroničnog zatajenja srca redovno pratiti (vidjeti dio 3).

Liječenje ne smijete naglo prekinuti, osim u slučaju kada postoje jasni razlozi i kada to procjeni Vaš ljekar (vidjeti poglavljje 3).

**Djeca i adolescenti**

Ne preporučuje se primjena **CORRIGO** tabletta kod djece i adolescenta radi nedostatka podataka o korištenju lijeka u tim dobnim grupama.

**Uzimanje drugih lijekova sa CORRIGO-m**

Uglavnom, **CORRIGO** tablette mogu se uzimati s drugim lijekovima. Međutim, važno je da obavijestite Vašeg ljekara o drugim lijekovima koje uzimate, uključujući i one koji se izdaju bez recepta, jer neki lijekovi mogu uticati na djelovanje drugih. Za propisivanje ispravne doze **CORRIGO** tabletta, posebno je važno da Vaš ljekar zna da li uzimate:

- druge lijekove za liječenje povišenog krvnog pritiska (klonidin; metildopa; gvanfacin; moksonidin; rimenidin; selektivni blokatori kalcijskih kanala- diltiazem, verapamil, nifedipin, amlodipin, felodipin, lacidipin, nikardipin, nimodipin, nitrendipin)
- lijekove za poticanje rada srca (digoksin)
- lijekove za liječenje nepravilnog ritma rada srca (amiodaron, lidokain, flekainid, kinidin, cibenzolin, dizopiramid, hidrokinidin, meksiletin, propafenon)
- lijekove za liječenje psihičkih poremećaja (fenotiazin, barbiturati)
- antidepresive (amitriptilin, paroksetin, fluoksetin)
- lijekovi koji se koriste tokom operacije za anesteziju
- lijekove za astmu, začepljen nos ili određene poremećaje očiju poput glaukoma (povišeni pritisak u očima) ili za dilataciju (širenje) zjenice
- baklofen (lijek protiv grčeva); amifostin (zaštitni lijek koji se koristi tokom liječenja karcinoma)
- lijekovi koji snižavaju šećer u krvi (oralni antidiabetici ili insulin)
- lijekovi za liječenje prekomjerne želučane kiseline ili za liječenje ulkuska (antacidi) npr. cimetidin: **CORRIGO** tablette trebate uzimati za vrijeme jela, a antacid između obroka.

**Uzimanje hrane i pića sa CORRIGO-m**

Lijk **CORRIGO** možete uzeti prije, za vrijeme ili poslije obroka, ili nezavisno od obroka. Najbolje je da tabletu popijete sa nešto vode.

**Trudnoća i dojenje**

**CORRIGO** tablette se ne smiju upotrebljavati u trudnoći, osim ako to doista nije nužno.

Ne preporučuje se uzimanje za vrijeme dojenja.

**Upravljanje vozilima i mašinama**

Ovaj lijek može uzrokovati vrtoglavice ili iscrpljenost. U tom slučaju, ne smijete voziti auto niti upravljati mašinama.

**Ostala upozorenja**

Ovaj lijek sadrži laktuzu. Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim ljekarom.

**3. Kako uzimati CORRIGO**

Uvijek uzimajte **CORRIGO** tablette onako kako Vam je ljekar propisao. Ako niste sigurni, provjerite sa svojim ljekarom. **CORRIGO** tablette možete uzimati prije, tokom ili nakon jela, a možete ga uzimati i neovisno o obrocima. Najbolje je uzeti tabletu s nešto vode.

**Liječenje povišenog krvnog pritiska**

Uobičajena doza je jedna tabletta (5 mg) na dan. Dozu treba, po mogućnosti, uzimati svakog dana u isto vrijeme. Učinak na sniženje krvnog pritiska očigledan je nakon 1-2 sedmice liječenja. Katkad se optimalni učinak postigne tek nakon 4 sedmice.

**Bolesnici s poremećajem rada bubrega**

Kod bolesnika s poremećajem rada bubrega liječenje se

preporučuje započeti s 2,5 mg nebivolola na dan. Ukoliko je potrebno, dnevna doza se može povećati na 5 mg.

#### **Bolesnici s poremećajem rada jetre**

U ovoj skupini bolesnika primjena nebivolola je kontraindicirana.

#### **Starje osobe**

Kod bolesnika starijih od 65 godina preporučena dnevna doza nebivolola je 2,5 mg. Ukoliko je potrebno, dnevna doza se može povećati na 5 mg.

#### **Liječenje hroničnog zatajenja srca**

Liječenje započinje dozom 1,25 mg nebivolola (1/4 tablete). Nakon 1-2 sedmice doza se može povisiti na 2,5 mg (1/2 tablete) tablete na dan, potom na 1 tabletu na dan do konačne 2 tablete na dan, sve dok se ne postigne doza koja je za Vas odgovarajuća.

Maksimalna preporučena doza nebivolola iznosi 10 mg (2 tablete) na dan. Uzmajte lijek jednom dnevno, po mogućnosti uvijek u isto vrijeme.

Na početku liječenja i svaki put kada se doza bude povećavala morat će tokom 2 sata biti pod nadzorom iskusnog ljekara. Ne preporučuje se nagli prekid liječenja nebivololom zbog mogućnosti prolaznog pogoršanja simptoma zatajenja srca. Ukoliko je potrebno prekinuti liječenje, doza nebivolola se treba postepeno smanjivati na polovicu doze svakih sedam dana.

#### **Bolesnici s poremećajem rada bubrega**

Nije potrebno prilagođavanje doze kod bolesnika s blagom do umjereno teškom insuficijencijom bubrega, dok se kod onih sa teškom insuficijencijom upotreba nebivolola ne preporučuje.

#### **Bolesnici s poremećajem rada jetre**

U ovoj skupini bolesnika primjena nebivolola je kontraindicirana.

#### **Starje osobe**

Nije potrebno posebno prilagođavanje doze kod starijih osoba.

#### **Ako uzmete više CORRIGO-a nego što ste trebali**

U slučaju predoziranja odmah kontaktirajte Vašeg ljekara tako da Vam se može smjesti pružiti medicinska pomoć. Najvjerojatniji simptomi bit će usporjen rad srca, snižen krvni pritisak, grč disajnih puteva i zatajenje funkcije srca. Dodatak starijemu, možete uzeti aktivni uglijen (dostupan u apoteci).

#### **Ako ste zaboravili uzeti CORRIGO**

Ako ste zaboravili uzeti CORRIGO tablete, a malo kasnije se sjetite da ste ga trebali uzeti, uzmetite dozu za taj dan kao i obično. Međutim, ako je prošlo više vremena (nekoliko sati) tako da je blizu vrijeme užimanja sljedeće doze, izostavite zaboravljenu dozu i u ubočljeno vrijeme uzmetite sljedeću predviđenu, normalnu dozu. Nemojte uzeti dvostruku dozu. Ponovljeno izostavljanje doze, treba međutim izbjegavati.

#### **Ako prestanete uzimati CORRIGO**

Posavjetujte sa ljekarom prije nego prestanete uzimati CORRIGO. Ne preporučuje se nagli prekid liječenja nebivololom zbog mogućnosti prolaznog pogoršanja simptoma zatajenja srca. Ukoliko je potrebno prekinuti liječenje hroničnog zatajenja srca CORRIGO tabletama, doza nebivolola se mora postepeno smanjivati na polovicu doze svakih sedam dana.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom CORRIGO obratite sa svom ljekaru ili farmaceutu.

#### **4. Moguća neželjena djelovanja**

Kao i svi drugi lijekovi i CORRIGO tablete mogu izazavati neželjena dejstva, iako se ona neće pojaviti kod svih bolesnika. Pacijenti uopšteno dobro podnose liječenje sa nebivololom.

#### **Moguća neželjena djelovanja pri uzimanju CORRIGO tableta za liječenje povisjenog krvnog pritiska:**

**Cesta neželjena djelovanja** (kod više od jedne na svakih 100, ali kod manje od jedne na svakih 10 lječenih osoba):

- Glavobolja
- Vrtoglavica
- Umor
- Neuobičajeni svrbež ili peckanje
- Proljev
- Zatvor
- Mučnina
- Kratkoča daha
- Otečene ruke ili stopala

**Manje česta neželjena dejstva** (kod više od jedne na svakih 1000, ali kod manje od jedne na svakih 100 lječenih osoba):

- Uspreni otkuci srca ili druge srčane smetnje
- Nizak krvni pritisak
- Bol pri hodanju nalik grču
- Nenormalan vid
- Impotencija
- Osjećaj depresije
- Probavne smetnje (dispepsijska), plinovi u želuču ili crijevima,

#### **povraćanje**

- Kožni osip, svrbež
- Nedostatak zraka kod astme, zbog iznenadnih grčeva mišića koji okružuju disajne puteve (bronhospazam)
- Noćne more

#### **Vrlo rijetka neželjena dejstva** (kod manje od jedne na svakih 10 000 lječenih osoba):

- Nesvestica
- Pogoršanje psorijaze (kožna bolest- ružičaste mrlje koje se ljušte)

Sljedeća neželjena dejstva su prijavljena u izoliranim slučajevima tokom liječenja nebivololom:

- Alergijske reakcije cijelog tijela sa generaliziranim kožnim promjenama (reakcije preosjetljivosti)
- Naglo otekuće, posebno oko usana, očiju ili jeziku sa mogućim iznenadnim otežanjem disanja (angioedem)
- Vrsta kožnog osipa sa svijetlo crvenim uzdignućima koja svrbe, alergijske ili nealergijske prirode

**Neželjena djelovanja uočena u kliničkom ispitivanju hroničnog zatajenja srca:**

#### **Vrlo česta neželjena dejstva** (kod više od jedne na svakih 10 lječenih osoba):

- Uspreni otkuci srca
- Omaglica

#### **Cesta neželjena djelovanja** (kod više od jedne na svakih 100, ali kod manje od jedne na svakih 10 lječenih osoba):

- Pogoršanje zatajenja srca
- Nizak krvni pritisak (npr. osjećaj nesvjestice pri naglom ustajanju)
- Nemogućnost podnošenja ovog lijeka
- Vrsta blagog poremećaja provodljivosti srca, koji utiče na srčani ritam (AV-blok prvog stepena)
- Oticanje nogu (poput otečenih gležnjeva)

#### **Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka**

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

#### **5. Kako čuvati CORRIGO**

CORRIGO morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece. Čuvajte CORRIGO na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju.

CORRIGO ne smijete koristiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju!

Rok trajanja lijeka je 3 godine od datuma proizvodnje koji je naznačen na pakovanju lijeka.

Rok trajanja se odnosi na zadnji dan navedenog mjeseca.

CORRIGO se ne smije uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog apotekara kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

#### **6. Dodatne informacije**

##### **Šta CORRIGO sadrži**

Svaka tabletta sadrži 5 mg nebivolola, u obliku nebivolol hidrohlorida, kao aktivnu supstancu.

Pomoćne supstance: laktaza monohidrat, mikrokristalna celuloza, kroskarmeloza natrij, povidon, poloksamer, magnezij stearat.

##### **Kako CORRIGO izgleda i sadržaj pakovanja**

CORRIGO tablete su bijele, uniformne, okrugle, sa diobenom crtom na jednoj strani.

30 (3x10) tabletta od 5 mg u blister pakovanju, u kutiji.

##### **PROIZVOĐAČ/PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA/NOSILAC DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET:**

ZADA Pharmaceuticals d.o.o.

Donji Bistarac bb

75300 Lukavac, Bosna i Hercegovina

##### **Režim izdavanja lijeka**

Lijek se izdaje na ljekarski recept.

##### **Broj i datum rješenja o odobrenju za stavljanje lijeka u promet:**

CORRIGO 30x5 mg tabletta: 04-07-3-1-4439/18 od 23.07.2020.

**Datum zadnje revizije teksta:** Oktobar, 2019.